【非弁膜症性心房細動】 DOAC減量基準と他の抗凝固薬との切り替え方法　ワーファリン1mg薬価：9.6円　　DIニュース No.581 付表（埼玉協同病院版）

薬品名　通常量	薬価	減量	主な禁忌	ワーファリン→DOAC	DOAC→ワーファリン	持続ヘパリン→DOAC	DOAC→ヘパリン
エリキュース錠 （2.5mg/5mg） 1回5mg　1日2回	1回5mg1日2回 （1日薬価:545.6円）	■下記のうち2項目が該当 ・80歳以上 ・体重60kg以下 ・Cre≧1.5 **→1回2.5mg1日2回**	■Ccr＜15	ワーファリン中止後、PT-INRが2.0未満となったらDOAC開始 【PT-INR＜2.0】	DOACにワーファリンを併用。PT-INRが治療域の下限を超えたら、DOAC中止 【治療域の設定は医師の判断とする（メーカーより）】	ヘパリン終了と同時にDOAC開始	DOAC中止、次回内服予定時間にヘパリン開始
リクシアナ錠 （15mg/30mg/60mg） 60kg以下） 1回30mg　1日1回 60kg超） 1回60mg　1日1回	1回30mg1日1回 （1日薬価:538.4円） 1回60mg1日1回 （1日薬価:545.6円）	**・60kg以下）** **→1回30mg　1日1回** **（減量基準なし）** **・60kg超）** ■15≦Ccr<50 ■併用薬に応じて（キニジン硫酸塩水和物、ベラパミル塩酸塩、エリスロマイシン、シクロスポリンの併用） **→1回30mg　1日1回**	■Ccr＜15	ワーファリン中止後、PT-INRが治療域（※）の下限以下となったら、DOAC開始 【PT-INR≦2.0（70歳未満）】 【PT-INR≦1.6（70歳以上）】	投与中のDOACを半量に減量し、ワーファリンと併用。PT-INRが治療域（※）に入ったら、DOAC中止 【PT-INR≧2.0（70歳未満）】 【PT-INR≧1.6（70歳以上）】	ヘパリン中止の【4±1時間後】にDOAC開始	DOAC中止、次回内服予定時間にヘパリン開始
試用）イグザレルト錠 （10mg/15mg） 1回15mg　1日1回	1回15mg1日1回 （1日薬価:545.6円）	■15≦Ccr≦49 **→1回10mg　1日1回**	■Ccr＜15 ■HIVプロテアーゼ阻害剤、コビシスタット含有製剤、アゾール系抗真菌薬（イトラコナゾール、ボリコナゾール、ミコナゾール、ケトコナゾール）（経口または注射）投与中 ■中等度以上の肝障害（Child-Pugh分類B又はCに相当）	ワーファリン中止後、PT-INRが治療域（※）の下限以下となったら、DOAC開始 【PT-INR≦2.0（70歳未満）】 【PT-INR≦1.6（70歳以上）】	DOACにワーファリンを併用。PT-INRが治療域（※）に入ったら、DOAC中止 【PT-INR≧2.0（70歳未満）】 【PT-INR≧1.6（70歳以上）】	ヘパリン終了と同時にDOAC開始	DOAC中止、次回内服予定時間にヘパリン開始
限定）プラザキサカプセル （110mg/150mg） 1回150mg　1日2回	1回150mg1日2回 （1日薬価:545.6円）	■30≦Ccr≦50 ■P-糖タンパク阻害剤（経口剤）併用者 ■70歳以上 ■消化管出血の既往 **→1回110mg　1日2回**	■Ccr＜30 ■イトラコナゾール（経口剤）投与中	ワーファリン中止後、PT-INRが2.0未満となったらDOAC開始 【PT-INR＜2.0】	DOACにワーファリンを併用。【PT-INR≧2.0（70歳未満）】【PT-INR≧1.6（70歳以上）】を確認し、DOAC中止（メーカー臨床試験結果より）	ヘパリン終了0～2時間前にDOAC開始	DOAC中止の【12時間後】にヘパリン開始

（※）日本循環器学会が推奨するワーファリンのPT-INRの治療域；70歳未満2.0～3.0　70歳以上1.6～2.6