


<今月のトピック 1 ; ピロリ除菌薬、喘息・COPD 吸入薬の採用薬の変更>

ピロリ菌 1 次除菌薬を『ボノサップパック 400』に採用変更します

<p>ボノサップパック 400</p> <p>タケキャブ錠 20mg (P-CAB) 2 錠 アモリンカプセル 250 (AMPC) 6 カプセル クラリス錠 200 (CAM) 2 錠</p>		<p>ラベキュアパック 400</p> <p>パリエット錠 10mg (PPI) 2 錠 サワシリン錠 250 (AMPC) 6 錠 クラリス錠 200 (CAM) 2 錠</p>
---	---	--

当院・浦和診療所の患者のピロリ除菌調査結果

薬名	ボノサップパック 400	ラベキュアパック 400
除菌成功率	89.1% (90/101人)	77.2% (122/158人)
男性	93.5%	79.1%
女性	85.5%	74.6%
薬価 (1シート1日分)	689.2円	460円

※検査方法は主に便検査で実施。除菌判定時期は 4 週間以上空いていることを確認。
除菌判定前の PPI 休薬は統一されていない。

ピロリ菌 2 次除菌薬を『ボノピオンパック 400』に採用変更します

<p>ボノピオンパック 400</p> <p>タケキャブ錠 20mg (P-CAB) 2 錠 アモリンカプセル 250 (AMPC) 6 カプセル フラジール内服錠 250mg (MNZ) 2 錠</p>	<p>当院・浦和診療所で調査したボノピオンパック 400 による 2 次除菌結果は、成功率は 100% でした。</p>
--	--

<除菌治療・検査における注意点>

【2 次治療】

飲酒を避けること：フラジール内服錠 (MNZ) との相互作用で腹痛・嘔吐・ほてりの出現リスク ↑

【効果減弱を避ける対策】

- ・禁煙：胃血流量が低下することで、クラリス錠 (CAM) の胃粘膜濃度低下が除菌率を下げる報告あり

【偽陽性を避ける対策】

- ・除菌判定には 60 日以上空ける (最低 4 週間以上)
- ・抗体法の場合は除菌後の陰性化に期間を要するため 6 ヶ月以上空けること

【偽陰性を避ける対策】

- ・検査の少なくとも 14 日以上前から PPI またはタケキャブを中止する。
- ・便中抗原法と抗体法を併用する ~参考「ピロリ菌除菌療法ハンドブック改訂版 2016 年 12 月作成」~

— 今月号の目次 —


- ① <今月のトピック 1 > ピロリ除菌薬、喘息・COPD 吸入薬の採用薬の変更 P1~2
- ② サーカネッテンからヘモナーゼに採用変更 インサイドパップ 1 袋の枚数を 5 枚から 7 枚に変更 P3
- ③ <DI 情報> プレアボイド情報、副作用報告、採用薬変更のお知らせ P3・4

ドライパウダー型長時間作用型抗コリン薬を『エンクラッセ』に採用変更します

エンクラッセ 62.5 μ g
エリプタ 30 吸入用(30 日分)



新規での処方は
『エンクラッセ』を推奨して
いきます



スピリーバ吸入用カプセル
18 μ g(7 日分/1 枚)



薬名	エンクラッセ 62.5 μ g エリプタ 30 吸入用	スピリーバ吸入用カプセル 18 μ g
成分	ウメクリジニウム臭化物吸入剤	チオトロピウム
適応	慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎、肺気腫）の軌道閉塞性障害に基づく諸症状の寛解	慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎、肺気腫）の軌道閉塞性障害に基づく諸症状の寛解 気管支喘息の軌道閉塞性障害に基づく諸症状の寛解
吸入回数	1日1回	1日1回
薬価(30日分)	6166.6円	6144 円
吸入操作	フタを開けるだけで吸入が可能。ややフタが硬い。	吸入のたびに毎回カプセルを吸入器にセットしなければならない

<現在当院で新規の処方可能な長時間作用型抗コリン薬>

ドライパウダー型:エンクラッセ 62.5 μ g エリプタ 30 吸入用 1日1回1吸入 1本 30日分

噴霧ソフトミスト型:スピリーバ 2.5 μ g レスピマット 1日1回2吸入 1本 30日分

『スピオルトレスピマット』『フルティフォーム 125 エアゾール』を試用開始

COPD 治療配合剤

(長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入 β 2刺激剤)

スピオルトレスピマット 60 吸入



スピリーバと比べて呼吸機能、息切れ、QOL、レスキュー薬の試用に有意に改善することが示されています。

加圧噴霧式定量吸入器 喘息治療薬

(吸入ステロイド (ICS) 及び長時間作用型吸入 β 2刺激剤 (LABA))

フルティフォーム 125 エアゾール 56 吸入用



エアゾール式のため吸入力に関わらず簡単な操作で服薬が可能。補助具なしではプッシュに力が必要なため、補助具を設置して使用することが望ましい。

サーカネッテン配合錠製造中止に伴いヘモナーゼ配合錠に採用変更しました

作用機序の違いと1日量の違いにご注意ください

サーカネッテン配合錠

<成分>パラフレボン・センナ末配合剤

<作用機序>炎症を抑え、痔核の静脈瘤に選択的に作用して、うっ血している静脈瘤血の凝固を促進し、血栓を形成させて痔核を治癒させる。

<用量>1日3回 1回2錠

<効能>痔核の症状（出血・疼痛、腫脹、痒み感）の寛解



ヘモナーゼ配合錠

<成分>プロメライン・トコフェロール酢酸エステル

<作用機序>消炎酵素薬プロメラインが炎症を抑える。またビタミンEが血流を改善し、うっ血状態を改善させる。

<用量>1日3～4回 1回1錠

※添付文書上は適宜増減となっておりますが、増量しても改善効果の増強が認められていないため、増量した場合は返戻・減点の対象となる可能性があります。

<効能>痔核・裂肛の症状（出血、疼痛、腫脹、痒感）の寛解

インサイドパップの包装単位を5枚入りから7枚入りに採用変更しました

最大処方量にご注意ください。

最大処方袋数が5枚14袋から、7枚入り10袋になりますのでご注意ください。

DI情報

<気になる事例の紹介～プレアボイド報告より～>

薬剤名	内容	処方の変更内容
プラバスタチン	・薬剤以外の原因によるCK上昇がある。一次予防で心血管病リスクの低い方で、中止でも問題ないと思われるためスタチンは継続で良いか確認。	中止
アクトネル錠(17.5)	アクトネル錠はCcr30ml/minには禁忌となっている	削除
レボフロキサシン錠	朝食後2時間内服となっているが、透析が10時なのでレボフロキサシンが透析によって除去される可能性がある。 投与時間を変更できないか問い合わせた。	朝食後→夕食後に変更
レボフロキサシン クエン酸第一鉄	鉄剤は入院前に夕に1錠しか飲んでいなかったとのこと。夕のみであれば相互作用を回避できる。	鉄剤は夕1錠に変更

<副作用報告> (県連DI委員会2月報告より) 副作用検討 3件

No	薬効分類	被疑薬	副作用症状	グレード	院所	評価
1	解熱鎮痛剤	カロナル錠 200	皮疹	2	所沢	可能性あり
2	骨粗鬆症治療剤	アレンドロン酸錠 35mg「アメル」	胃部不快感	1	秩父	可能性あり
3	プロトンポンプインヒビター 合成ペニシリン製剤 マクロライド系抗生物質製剤	ボノサップパック 400	皮疹	2	協同	可能性あり
			肝機能障害 掻痒感	2 1		

<採用薬変更のお知らせ> (県連薬事委員会 3月報告より)

新規採用					採用削除							
変更理由	メーカー	薬品名	規格	薬価	メーカー	薬品名	規格	薬価				
新規採用	大塚製薬	ニュープロパッチ	2.25mg	278 円	/							
			4.5mg	428.4 円								
			13.5mg	850.1 円								
新規採用	日本ベーリンガーインゲルハイム	ビ・シフロール錠	0.125mg	45.7 円								
			0.5mg	155.4 円								
新規採用	ノバルティスファーマ	スタレボ配合錠	50mg	209.7 円								
			100mg	209.7 円								
新規採用	GSK	レキップ CR 錠	2mg	281.2 円								
			8mg	966 円								
新規採用	藤本製薬	エフピーOD 錠 2.5		313.4 円								
新規採用	協和発酵キリン	ノウリアスト錠 20mg		782.4 円								
採用見直し	MSD	メネシット配合錠 100mg		31.00 円					協和発酵キリン	イーシー・ドパール配合錠		27.8 円
規格見直し	久光製薬	インサイドパップ 70mg7 枚入り		16.4 円					久光製薬	インサイドパップ 70mg5 枚入り		16.4 円
採用見直し	GSK	エンクラッセ 62.5µg エリプタ 30 吸入用		6166.6 円	日本ベーリンガーインゲルハイム	スピリーバ吸入用カプセル 18µg		193.8 円/C				
採用見直し	武田薬品	ボノサップパック 400		689.2 円	エーザイ	ラベキュアパック 400		460 円/シート				
新規採用	武田薬品	ボノピオンパック		654.6 円								
規格追加	ニプロ	トラネキサム酸注 1g 「NP」		68 円								
規格追加	日医工	オルメサルタン錠 「日医工」	5mg	12.5 円								
					第一三共	カルベニン点滴用 0.5g						
					サノフィ	エホチール錠 5mg						
					日本ベーリンガー	エホチール注 10mg						
					日本新薬	イソミタール原末						

情報の提供・お問い合わせは、埼玉協同病院薬剤科 DI室 (内線 9404) までどうぞ
 担当：清水・中村・玉水・木村・相良 Tel 048-296-9249 Fax 048-296-5719