埼玉協同病院　吸入薬処方一覧　　2020. 2作成

分類		商品名	薬価(円)	適応	回数・吸入数	備考	切替例
ステロイド（ICS）	DPI	【ドライパウダー第1選択薬】 アニュイティ100μ gエリプタ （30吸入用）	1816.5	気管支喘息	1日1回 【低用量】 100μ g 【高用量】 200μ g	フルタイドディスカスから変更	【低用量】 フルタイド100 1日2回　1吸入/回 ⇒ 【低用量】 アニュイティ100 1日1回　1吸入/回 オルベスコ100μ g 1日1回　1～2吸入/回 パルミコート100μ g 1日2回　1～2吸入/回
		アニュイティ200μ gエリプタ （30吸入用）	2351.7				
	pMDI	【エアゾール第1選択薬】 オルベスコ100μ gインヘラー （112吸入用）	2165.1	気管支喘息	1日1回 【低用量】 100～200μ g/回 【高用量】 200～400μ g/回	症状に応じて 1日最高800μ gまで 800μ g投与する場合、 400μ g×2回として 投与する ※成人量	【高用量】 フルタイド200 1日2回　1吸入/回 ⇒ 【高用量】 アニュイティ200 1日1回　1吸入/回 オルベスコ200μ g 1日1回　1～2吸入/回 パルミコート200μ g 1日2回　1～2吸入/回
		オルベスコ200μ gインヘラー （56吸入用）	2135.8				
	DPI	パルミコート100μ gタービュヘイラー （112吸入）	1323.4	気管支喘息	1日2回 【低用量】 100～200μ g/回 【高用量】 200～400μ g/回	症状に応じて 1日最高1600μ gまで ※成人量	
		パルミコート200μ gタービュヘイラー （112吸入）	1691.5				
長時間作用型β2刺激薬（LABA）	DPI	オンブレス吸入用カプセル150μ g	139.4/日 ↓ 4182/月 ※2	COPD	1日1回 1カプセル/回	専用吸入器に カプセルをセットする セレベントディスカスから変更	セレベント50 1日2回　1吸入/回 ⇒ オンブレスカプセル150μ g 1日1回　1吸入/回 ※2 日＝1カプセルの薬価 月＝30日分に換算した薬価

DPI：ドライパウダー吸入器
pMDI：加圧式定量噴霧吸入器
SMI：ソフトミスト吸入器

埼玉協同病院　吸入薬処方一覧　　2020. 2作成

分類		商品名	薬価(円)	適応	回数・吸入数	備考	切替例
長時間作用型抗コリン薬（LAMA）	DPI	【ドライパウダー第1選択薬】 エンクラッセ62.5μ gエリプタ （30吸入用）	5621.2	COPD	1日1回 1吸入/回		エクリラ400μ g 1日2回　1吸入/回 ⇒ エンクラッセ62.5μ g 1日1回　1吸入/回 スピリーバ2.5μ g 1日1回　2吸入/回
	SMI	【エアゾール第1選択薬】 スピリーバ2.5μ gレスピマット （60吸入）	4845.8	気管支喘息	1日1回 1～2吸入/回	気管支喘息の場合は 低用量から	
				COPD	1日1回 2吸入/回		
	DPI	【限定】 エクリラ400μ gジェヌエア （60吸入用）	5725.3	COPD	1日2回 1吸入/回	限定薬	
ステロイド＋β2刺激薬（ICS＋LABA）	DPI	【ドライパウダー第1選択薬】 レルベア100エリプタ （30吸入用）	5558	気管支喘息 COPD	1日1回 【低用量】 100μ g 【高用量】 200μ g	COPDは200μ gの 適応無し アドエアディスカス から変更	【低用量】 アドエア250 1日2回　1吸入/回 ⇒ 【低用量】 レルベア100 1日1回　1吸入/回 フルティフォーム125 1日2回　2吸入/回 シムビコート 1日2回　1～2吸入/回
		レルベア200エリプタ （30吸入用）	6201.5				
	pMDI	【エアゾール第1選択薬】 フルティフォーム125エアゾール （120吸入用）	6031.4	気管支喘息	1日2回 【低用量】 2吸入/回 【高用量】 3～4吸入/回		【高用量】 アドエア500 1日2回　1吸入/回 ⇒ 【高用量】 レルベア200 1日1回　1吸入/回 フルティフォーム125 1日2回　3～4吸入/回 シムビコート[ブデホル] 1日2回　3～4吸入/回
	DPI	シムビコートタービュヘイラー （60吸入） [試用・後発医薬品] ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	4252 [2135.9]	気管支喘息	1日2回 【低用量】 1～2吸入/回 【高用量】 3～4吸入/回	SMART療法（※1） 発作時追加吸入可	※1　1回1吸入あるいは2吸入を1日2回投与している患者は発作発現時に本剤の頓用吸入を追加可。頓用吸入する場合は、発作発現時に1吸入する。数分経過しても発作が持続する場合には、さらに追加で1吸入する。必要に応じてこれを繰り返すが、1回の発作発現につき，最大6吸入までとする。
				COPD	1日2回 2吸入/回	SMART療法　不可	

DPI：ドライパウダー吸入器
pMDI：加圧式定量噴霧吸入器
SMI：ソフトミスト吸入器

埼玉協同病院　吸入薬処方一覧　　2020. 2作成

分類		商品名	薬価(円)	適応	回数・吸入数	備考	切替例
（LABA+LAMA）β2刺激薬+抗コリン薬	DPI	【ドライパウダー第1選択薬】 アノーロエリプタ （30吸入用）	7585.6	COPD	1日1回 1吸入/回		ウルティブロカプセル 1日1回　1吸入/回 ※2 日＝1カプセルの薬価 月＝30日分に換算した薬価 ⇒ アノーロ 1日1回　1吸入/回 スピオルト 1日1回　2吸入/回
	SMI	【エアゾール第1選択薬】 スピオルトレスピマット （60吸入）	7582	COPD	1日1回 2吸入/回		
	DPI	【限定】 ウルティブロ吸入用カプセル	241.5/日 ↓ 7245/月 ※2	COPD	1日1回 1カプセル/回	専用吸入器に カプセルをセットする 限定薬	
ICS+LABA+LAMA	DPI	テリルジー100エリプタ （30吸入用）	8853.8	COPD	1日1回 1吸入/回		エンクラッセ62.5μｇ レルベア100 各　1日1回　1吸入/回 薬価　11314.1円 ⇒ テリルジー100 1日1回　1吸入/回 8853.8円

■切り替えの際の留意事項
原則として 【低用量】→【低用量】【高用量】→【高用量】 で切り替える。

■ドライパウダーとエアゾールの使い分け
・ドライパウダー：吸入のタイミングを同調する必要がなく、自身のタイミングで吸うことができる。吸気速度が弱い患者には不適。
・エアゾール　　：効果が吸気速度に依存せず、粒子径も小さい。吸気と薬剤の噴霧を同調できない患者には不適。

■薬価は2020年4月1日以降のものです

DPI：ドライパウダー吸入器
pMDI：加圧式定量噴霧吸入器
SMI：ソフトミスト吸入器