

当院取り扱い貼付剤の切断使用・再貼付可否について

商品名 (成分名)	薬効分類	切断使用	貼り直し	入浴
フラントールテープ [®] (硝酸イソルビトール)	血管拡張薬	○	○ (貼付部位変更)	○
ノルスパンテープ [®] (ブプレノルフィン)	非麻薬性 鎮痛薬	× (1)	× 一部剥がれた場合はテープなどで 固定。粘着力が弱くなった場合は、 ただちに新しいものに貼り替える。	△ (4)
フェントステープ [®] (フェンタニルエン酸塩)	麻薬性 鎮痛薬			
ヒソソテープ [®] (ヒソソプロロール)	心疾患治療薬	○	○ (貼付部位変更)	○
ロナセンテープ [®] (ブロナンセリン)	統合失調症 治療薬	× (1)	○ 一部剥がれた場合はテープなどで 固定。完全に剥がれた場合は 再度貼 付 または新しく貼り替える	○
ネオキシテープ [®] (オキシブチン塩酸塩)	頻尿・過活動 膀胱治療薬	○	× (2)	○
イクセロンパッチ [®] (リバスタグミン)	アルツハイマー型 認知症治療薬	× (1)	× (2)	○
ツロブテロールテープ [®] 「久光」	気管支拡張薬	○	× 貼付後 12 時間を経て剥がれた場合は、 新しく貼付する必要はない。 再貼付での過量投与による副作用は 発現しにくいと考えられている。	○
エストラーナテープ [®] (エストラジール)	ホルモン製剤	× (1)	× (2)	○
メノエイトコンビパッチ [®] (エストラジール・酢酸ノ ルエチステロン)	ホルモン製剤	× (1)	△ (粘着力が弱くなった場合は新し いものを貼付)	○
ニュープロパッチ [®] (ロチゴチン)	パーキンソン病 治療薬	×	× (2)	○
ニコチル TTS (ニコチン)	禁煙補助薬	×	× (2)	○

<備考>

- (1) 安全性・有効性・品質保持に関するデータがないことに加え、切断することで角がはがれやすくなるため、推奨されていない。
- (2) 新しいものを貼付。次の貼り替えは通常通りの時間に貼付。
- (3) 熱い温度での入浴は避ける

当院取り扱い貼付剤の特徴、注意点

商品名	・用法 ・貼付部位	注意点
フランド [®] テープ	・24時間又は48時間毎 ・胸部、上腹部、背部	入浴によって血管拡張作用が増強し、一時的にふらつきを生じる可能性あり
ノルパ [®] ンテープ	・7日に1回 ・前胸部、上背部、上腕外部又は側胸部 同じ場所に貼る場合は、3週間以上の間隔をあける	・貼付部位に火傷を引き起こす恐れがあるため、MRI検査の実施前に剥がすこと。 ・加温のほか、発熱や発汗で急激に吸収され、呼吸抑制が生じる可能性あり。
フェントテープ [®]	・24時間毎 ・胸部、腹部、上腕部、大腿部	・加温のほか、発熱や発汗で急激に吸収され、呼吸抑制が生じる可能性あり
ビソ [®] テープ	・24時間毎 ・胸部、上腕部、背部	
ロセンテープ [®]	・24時間毎 ・胸部、腹部、背部	・光線過敏症が発現するリスクがあるため、貼付部位に直射日光が当たらないようにする。
ネキシテープ [®]	・24時間毎 ・腹部、腰部、大腿部	・ベルトなどが当たるところは避ける
イクセロン [®] パッチ	・24時間毎 ・背部、上腕部、胸部	
ツロブ [®] テロールテープ 「久光」	・24時間毎 ・背部、上腕部、胸部	
エストラ [®] ナテープ	・2日毎 ・下腹部、臀部	・ベルトなどが当たるところは避ける ・胸部に貼付しないこと
メノイト [®] コンビ [®] パッチ	・週に2回(3~4日毎に) ・下腹部	・ベルトなどが当たるところは避ける ・胸部に貼付しないこと ・冷所保存する。
ニュー [®] プロ [®] パッチ	・24時間毎 ・肩、上腕部、腹部、側腹部、臀部、大腿部	・貼付部位に火傷を引き起こす恐れがあるため、MRI検査の実施前に剥がすこと。 ・有効成分の結晶が析出して血中濃度が低下する恐れがあるため、切って使用しないこと。
ニコチル TTS	・24時間毎 ・上腕部、腹部、腰部 10週間を超えて使用しない。	・貼付部位に火傷を引き起こす恐れがあるため、MRI検査の実施前に剥がすこと。 ・薬物貯留層から薬剤が漏れ出す恐れがあるため、切って使用しないこと。

*各種製剤のインタビューフォーム、製薬企業のHPをもとに作成

—今月号の目次—

- ①<今月のトピック1>当院取り扱い貼付剤の切断使用・再貼付可否について……………P1
- ②<今月のトピック2>当院取り扱い貼付剤の特徴、注意点……………P2
- ③<今月のトピック3>トリノシン顆粒10%欠品に伴う代替薬の提案……………P3
- ④<DI情報>副作用報告、プレアポイド報告、採用薬変更のお知らせ……………P4

トリノシン顆粒 10%欠品に伴う代替薬の提案

トリノシン顆粒10%欠品が続き、ご迷惑おかけしております。

供給再開までの期間、下記の薬剤を代替薬としてご参考ください。

ただし、代替薬も根本的な改善にはつながりません。薬では少し楽になる程度と言われて
います。運動やストレッチ体操などもご検討ください。

<めまい治療薬>

商品名（一般名）	作用・効果	注意事項	備考
メリスロン（ベタヒスチンメシル酸塩錠）	・内耳の血流改善作用 ・脳循環改善作用 ・内リンパ水腫除去		ベタヒスチンで効果不十分ならセファドールを試す
セファドール錠（ジフェニドール）	・内耳の血流改善作用 ・嘔吐中枢抑制作用	抗コリン作用があるため緑内障や前立腺肥大は慎重に投与。	頓用を推奨
トラベルミン配合錠（ジフェンヒドラミンサリチル酸塩）	・内耳の反応鎮静作用 ・嘔吐中枢抑制作用		
半夏白朮天麻湯	胃腸が弱く疲れやすく、冷え症の体質の人で、頭重感を伴い、「ふらふら感」を訴えるときに効果あり		
真武湯	冷えやむくみがあり比較的高齢で歩行が安定せず「歩くとふらふらする」ときに効果あり。		
カリジノゲナーゼ（カリジノゲナーゼ）	・血管を拡張して末梢血管循環改善作用。 ・内耳の血流改善作用	悪心、動悸、熱感に注意する。	めまいへの使用頻度は少ない

【耳鼻咽喉科 越智医師より提案】

運動・ストレッチを試した上で、メリスロンまたはセファドールでも効果不十分な場合

1. メリスロン+半夏白朮天麻湯（ツムラ37）またはメリスロン+頓用トラベルミン
2. メリスロン+抗うつ薬/睡眠導入薬
3. 原因診断をしっかりとる

DI 情報

【副作用報告】 DI委員会 9月報告

No	薬効分類	被疑薬	副作用症状	グレード	院所	評価
1	抗生物質	バクタミン配合錠	薬疹 掻痒感	2 1	協同	可能性あり 可能性あり
2	脂質異常症治療薬	アトルバスタチン	倦怠感	1	かすかべ	可能性あり
3	頻尿治療薬	塩酸プロピペリン錠 10mg「タツミ」	尿閉	2	川口	可能性あり
4	漢方	オースギ当帰芍薬散料エキス G	発疹 掻痒感	1 1	川口	可能性あり
5	制吐薬	プラミール錠 5mg	レストレスレッグス症候群	1	川口	可能性あり
6	睡眠薬	ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「ファイザー」	肝機能障害	2	秩父	可能性あり
7	降圧薬	ニフェジピンL錠 20mg「日医工」	眼瞼浮腫	2	さいわい	可能性あり

【気になる事例の紹介～プレアボイド報告より～】

薬剤名	経過・内容・	対応
ベタヒスチン	記録ではめまいの他に黒色便もあり消化性潰瘍疑いあり。ヒスタミン類似作用のため消化性潰瘍にベタヒスチンは慎重投与となっている。主治医に確認。	めまいは軽度のため処方削除
トリプタノール ミニリンメルト	トリプタノール10mg内服中に他院からミニリンメルト錠開始。血液検査実施し、Na: 123mEq/Lとなっていること確認。トリプタノール中止対応へ。痙攣発作はなし。	トリプタノール中止。痙攣発作はなし
アミカシン	MRCNS検出のため使用と記載あり。MRCNSへの第一選択ではないため検査結果を確認したところ、AMKの感受性試験結果はなく、ABKの試験結果が載っていた。医師はABKをAMKと勘違いしていた。	バンコマイシンを1日1回400mgで提案し、変更となった。

【採用薬変更のお知らせ】 (県連薬事委員会9月報告より)

新規採用・新規試用				採用削除		
変更理由	メーカー	薬品名	薬価	メーカー	薬品名	薬価
採用	アステラス	アーガメイト20%ゼリー	75.1 円/個			
後発変更	ニプロ	デュタステリドカプセル0.5mgAV「ニプロ」	59.3 円	GSK	アボルブカプセル0.5mg	214.0 円
	小林化工	エゼチミブ錠10mg「KN」	63.1 円	MSD	ゼチーア錠10mg	173.2 円
	沢井	エルデカルシトールカプセル0.5μg/0.75μg「サワイ」	35.3 円/0.75		エディロールカプセル0.5μg/0.75μg	98.2 円/0.75
	わかもと	ドルモロール配合点眼液「わかもと」	236.8 円/mL	参天	コソプト配合点眼液	540.0 円/mL
	日東メディック	トラチモ配合点眼液「ニットー」	538.5 円/mL	ノバルティス	デュオトラバ配合点眼液	1092.3 円/mL
		チモロールXE点眼液0.5%「TS」	285.8 円/mL	参天	チモプトールXE点眼液0.5% (586.4 円/mL
	日東メディック	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ニットー」	158.6 円/mL		協同病院は先発のまま	
販売変更	共和クリティケア	パンテノール注500mg「KCC」	57.0 円/A	共和クリティケア	パンテニール注500mg	57.0 円/A
削除				日東メディック	ヒアロンサン点眼液0.3%	308.9 円/本
				岩城製薬	パルデス軟膏0.05%/ローション0.05%	9.0 円/g
				ゾンネボード製薬	アデロキザール散7.8%	
				吉田/山善	アクリノール0.1%液「ヨシダ」/ アクリノール外用液0.2%「ヤマゼン」	
				MSD	イントロンA注射用600	
試用	マルホ	ゼビアックスローション2% (10g/本)	74.0 円/g			
	陽進堂	マンニトールS注射液(ソフトバッグ) (300mL/袋)	480 円/袋			

情報の提供・お問い合わせは、埼玉協同病院薬剤科 DI室 (内線9404) までどうぞ
 担当 宮田・中村・山田・木村・相良