

【小児科約束処方】＜院外処方・院内処方＞ 6歳以下の約束処方は1日2回の用法に変更しました。(2022.8～)

想定体重	5kg前後	7kg前後	10kg前後	15kg前後	20kg前後	25kg
年齢の目安	6ヶ月	1歳	1～2歳	3歳	6歳	9歳
①カルボシステイン 分2	1/2カルボシステイン0	カルボシステイン0	カルボシステイン1	カルボシステイン3	カルボシステイン6	カルボシステイン9 分3
カルボシステイン50%	150mg(秤量0.3g)	200mg(秤量0.4g)	300mg(秤量0.6g)	450mg(秤量0.9g)	600mg(秤量1.2g)	750mg(秤量1.5g)

←薬包紙表示

②アンブロキシール/カルボシステイン 分2	1/2(アンブ/カルボ)0	(アンブ/カルボ)0	(アンブ/カルボ)1	(アンブ/カルボ)3	(アンブ/カルボ)6
カルボシステイン50%	150mg(秤量0.3g)	200mg(秤量0.4g)	300mg(秤量0.6g)	450mg(秤量0.9g)	600mg(秤量1.2g)
アンブロキシール塩酸塩DS小児用1.5%	4.5mg(秤量0.3g)	6mg(秤量0.4g)	9mg(秤量0.6g)	13.5mg(秤量0.9g)	18mg(秤量1.2g)

←薬包紙表示

③アンブロキシール/カルボシステイン/ホクナリン 分2	1/2(アンブ/カルボ/ホクナリン)0	(アンブ/カルボ/ホクナリン)0	(アンブ/カルボ/ホクナリン)1	(アンブ/カルボ/ホクナリン)3	(アンブ/カルボ/ホクナリン)6
カルボシステイン50%	150mg(秤量0.3g)	200mg(秤量0.4g)	300mg(秤量0.6g)	450mg(秤量0.9g)	600mg(秤量1.2g)
アンブロキシール塩酸塩DS小児用1.5%	4.5mg(秤量0.3g)	6mg(秤量0.4g)	9mg(秤量0.6g)	13.5mg(秤量0.9g)	18mg(秤量1.2g)
ホクナリン	0.2mg(秤量0.2g)	0.3mg(秤量0.3g)	0.4mg(秤量0.4g)	0.6mg(秤量0.6g)	0.8mg(秤量0.8g)

←薬包紙表示

④ホクナリンドライシロップ 分2	1/2ホクナリンドライシロップ0	ホクナリンドライシロップ0	ホクナリンドライシロップ1	ホクナリンドライシロップ3	ホクナリンドライシロップ6
ホクナリンドライシロップ0.1%	0.2mg(秤量0.2g)	0.3mg(秤量0.3g)	0.4mg(秤量0.4g)	0.6mg(秤量0.6g)	0.8mg(秤量0.8g)

←薬包紙表示

⑤カロナール		カロナール0	カロナール1	カロナール3	カロナール6
カロナール細粒(200mg/g)	設定無し	80mg	100mg	150mg	200mg

←薬包紙表示

⑥整腸剤 分2		ビオスリー0	ビオスリー1	ビオスリー3	ビオスリー6	ビオスリー9
ビオスリー	設定無し	0.5g	1g	1.5g	2g	3g 分3

←薬包紙表示

＜院外処方のみ＞

①アスベリン/アンブロキシール/カルボシステイン 分2	1/2風邪0	風邪0	風邪1	風邪3	風邪6
10%アスベリン	10mg(秤量0.1g)	15mg(秤量0.15g)	20mg(秤量0.2g)	30mg(秤量0.3g)	40mg(秤量0.4g)
アンブロキシール塩酸塩DS小児用1.5%	4.5mg(秤量0.3g)	6mg(秤量0.4g)	9mg(秤量0.6g)	13.5mg(秤量0.9g)	18mg(秤量1.2g)
カルボシステイン50%	150mg(秤量0.3g)	200mg(秤量0.4g)	300mg(秤量0.6g)	450mg(秤量0.9g)	600mg(秤量1.2g)

←薬包紙表示

1日量換算

・10%アスベリン(チペピジンヒベンズ酸として)	2mg/kg/日	最大120mg/日
・カルボシステイン50%(カルボシステインとして)	30mg/kg/日	最大1500mg/日
アンブロキシール塩酸塩DS小児用1.5%	0.9mg/kg/日	最大45mg/日
・ホクナリン(ツロプテロール塩酸塩として)	0.04mg/kg	最大2mg/日
・カロナール細粒(アセトアミノフェンとして)	10～15mg/kg/回	1回500mg、1日最大60mg/kgまたは1500mgまで

2022.8.1改訂