

## コロナワクチンと他のワクチンの接種間隔について

インフルエンザワクチン接種がピークを迎えています。同時に BA5 対応型のコロナワクチンを接種する人も増えており、投与間隔に関する問い合わせが増加しています。  
インフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチン（ニューモバックス）を同時に接種する人も増える時期ですので、コロナワクチンとの接種間隔にご注意ください。

### インフルエンザワクチンとコロナワクチン

インフルエンザ  
ワクチン

間隔の  
規定なし

新型  
コロナワクチン

【同時も可】

インフルエンザワクチンのみ

新型  
コロナワクチン

間隔の  
規定なし

インフルエンザ  
ワクチン

前後ともに  
1日空けても OK、  
1週間空けても OK  
接種のタイミングはいつでも可

### インフルエンザワクチン以外とコロナワクチン

インフルエンザ  
ワクチン以外

2週間後

新型  
コロナワクチン

生ワクチン、不活化ワクチン全  
て前後 2 週間空ける

新型  
コロナワクチン

2週間後

インフルエンザ  
ワクチン以外

例) 12月1日にコロナワクチン投与した場合、他のワクチンを投与出来るのは12月15日  
(2週間後の同じ曜日の日)

※ただし創傷時の破傷風トキソイド等、緊急性を要するものに関しては2週間を空けずに接種することが可能

<参照資料>

厚生労働省ホームページ

新型コロナウイルスとインフルエンザワクチンの同時接種の有効性・安全 (第33回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料より抜粋)

## オミクロン株 BA. 4/5 対応型 2 価ワクチン接種について

- 直近の接種日から3ヶ月経過していれば接種可能です。
- オミクロン株対応ワクチンは、原則1回しか接種出来ません。(オミクロン型は2種類あります)  
9月に一時的に流通した『オミクロン株 BA. 1 対応型 2 価ワクチン』を接種した方は  
今回の『BA. 4/5 対応型 2 価ワクチン』は接種出来ません。
- 4回目を『従来株(武漢型)ワクチン』で接種した方は3ヶ月空いていれば『オミクロン株 BA. 4/5 対応型 2 価ワクチン』が接種可能です。
- 今回の接種が1回目、2回目の方は、従来型となり、オミクロン株対応型は接種出来ません。
- 前回接種したワクチンがノバックス製の場合は、個別にご相談ください。

## ピコスルファート Na 内用液 成人は1回10～15滴

ピコスルファート Na は大腸刺激性下剤の1つで、古くから用いられている便秘治療薬です。内用液は剤形が液剤のため便性状に応じて用量を調節し易いといった特徴もあります。

当院でも広く使用されていますが、1回に十分な量が投与されず、増量されないまま浣腸などの処置が必要となり、看護・介護スタッフの負担増となっている現状があるとの声が挙げられています。

添付文書より

【効能・効果】各種便秘症など

【用法・用量】通常成人に対して、1日1回10滴～15滴。適宜増減可能。

小児に対しては1日1回、次の基準で経口投与する

年齢	6ヶ月以下	7～12ヶ月	1～3歳	4～6歳	7～15歳
用量(滴数)	2	3	6	7	10

### 成人の通常用量は1回10～15滴です。

効果が得られない場合には、投与量が少な過ぎていないか用量の確認をお願い致します。

### 〈他の大腸刺激下剤との臨床上的相当量〉

ピコスルファート Na  
内用液  
6滴

≒

センノシド錠  
12mg  
1錠

≒

アローゼン顆  
粒(0.5g/包)  
1包～2包

※ピコスルファート Na 内用液の成人での通常用量は10～15滴です。

#### 〈参考資料〉

ピコスルファートの先発品であるラキソベロン内用液の臨床試験におけるセンノシドとの比較試験

—今月号の目次—

- ①<今月のトピック 1>コロナワクチンと他のワクチンの接種間隔について・・・P1
- ②<今月のトピック 2>オミクロン株 BA. 4/5 対応型 2 価ワクチン接種について・・・P2
- ③<今月のトピック 3>ピコスルファート Na 内容液 使用用量について・・・P2
- ④<今月のトピック 4>ジクトルテープ使用時の注意事項・・・P3
- ⑤<DI 情報>・・・P3/4
- ⑥<付表>コロナワクチン別 対象年齢、接種間隔、接種可能なワクチン

## ジクトルテープに新たな適応（『腰痛症』他）が追加しました

がん患者のみの適応であった経皮吸収型の持続性疼痛治療薬ジクトルテープ 75mg（一般名 ジクロフェナクナトリウム）が、がん患者への以外への使用が認められました。  
 新たな適応は、【腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎】です。  
 形状は貼付剤ですが、既存のロキソニンテープ等の消炎鎮痛貼付剤とは使い方や処方の方が異なりますのでご注意ください。

### 【追加された用法に対する注意点】

- 1日1枚（75mg）または2枚（150mg）、1日（約24時間）毎に貼り替える。
- 既存の湿布貼付剤と異なり、全身性の効果があるため処方日数制限がない。
- 1日1枚または2枚の計算で処方日数の通りに処方が可能。
  - ・ 例）56日処方であれば112枚まで
  - ・ ジクトルテープ 75mgのみ処方の場合、他の参考になる処方日数の薬がないため、上限がなくなるが、91日分182枚を目安にする。
- 他のジクロフェナク製剤との併用は不可
- CC r 30以下は使用不可

### <内服との換算目安>

ジクトルテープ 3枚（225mg）≒ ジクロフェナク錠（25mg）4錠（100mg）

※非がん患者への使用上限は2枚

ジクトルテープはもともとがんの患者への使用を目的に製造されました。がん患者は皮膚が非常に弱いことが多いため、敢えて粘着力を弱くして製品化しています。  
 そのため、他の湿布薬と比べると非常に剥がれやすくなっています。

### <貼付時の注意点>

- ・ 関節など可動部分への貼付は避けること
- ・ 洋服や布団などで擦られる部分への貼付は避けること
- ・ 剥がれてしまっても、粘着力が残っていたらそのまま貼り直すこと
- ・ 再貼付が難しければ新しいテープを使用すること

## DI 情報

### 【副作用報告】 DI 委員会 10月報告

No	被疑薬	副作用症状	グレード	院所	評価
1	シロドシン 0D 錠 4mg 「YD」	下痢	1	協同	可能性あり
2	スーグラ錠 50mg	正常血糖ケトアシドーシス	3	協同	可能性あり
3	スーグラ錠 25mg	正常血糖ケトアシドーシス	1	協同	可能性あり
4	トラディアンス配合錠 AP	正常血糖ケトアシドーシス 尿路感染症	1 2	協同	可能性あり
5	バクトラミン配合錠	汎血球減少症 低ナトリウム血症 薬剤性肝障害	3 3 1	西協同	可能性あり

6	アシクロビル点滴静注用 250mg 「トーワ」	薬疹	2	熊谷	可能性あり
7	ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg 「サワイ」	じんま疹 そう痒	2 1	秩父	可能性あり
8	ケアラム錠 25mg	口内炎	1	秩父	可能性あり

### 【気になる事例の紹介～プレアボイド報告より～】 10月報告

薬剤名	経過・内容
ロキソプロフェン錠 マイスリー錠	Cov陽性で、同日夜より足がむずむずする感じが出現。 不眠ありマイスリー錠処方。発熱継続ありロキソプロフェン錠が処方。 翌日手足に湿疹発現。薬疹の可能性ありロキソプロフェン錠をコロナール錠に提案した。ロキソプロフェン錠からコロナール錠に変更、マイスリー錠は中止した。
オーグメンチン配合錠 サワシリン錠	2年前ボノサップパックで薬疹疑いがカルテ記録および副作用登録あり。 憩室炎疑いでオーグメンチン配合錠、サワシリン錠の処方あったため、医師へ腹腔内感染症で嫌気性菌を狙う際の抗菌薬について提案した。 オーグメンチン配合錠、サワシリン錠は処方削除となりレボフロキサシン錠、フラジール錠処方となった。
フェロ・グラデュメット錠	胃全摘している方。 フェロ・グラデュメット錠処方となったが、フェロ・グラデュメット錠はpH高いと吸収低下の懸念あり、pHによる影響を受けないクエン酸第一鉄Na錠を提案し変更となった。

### 【採用薬変更のお知らせ】（県連薬事委員会 10月報告より）

新規採用・新規試用				採用削除		
理由	メーカー	薬品名	薬価	メーカー	薬品名	薬価
販売中止	塩野義	ベリチーム配合顆粒	10.4円	鶴原	オーネス ST 配合錠	5.7円
他社変更	丸石	アセトアミノフェン錠 200mg/500mg 「マルイシ」	5.9円 /200mg	あゆみ	コロナール錠 200/500 (	5.9円 /200mg
取違防止				テルモ	リン酸2カリウム注 20mEq キット「テルモ」	174円/本
新規採用	大塚製薬工場	リン酸Na補正液 0.5mmol/mL	122円/A			
	日東薬工	デノタスチュアブル配合錠	14.7円			
臨時取扱	田辺三菱	バリキサ錠 450mg バリキサD. S5000mg	2403.1円 498.8円/mL		デノシンー時供給停止のため	
後発変更	日本化薬	ボルテゾミブ注射用 3mg 「NK」	38694円/V	ヤンセン	ベルケイド注射用 3mg	87904円/V
新規試用	ユーシービー	ビムパット点滴静注 100mg	2451円/V			
	住友ファーマ	ツイミーグ錠 500mg	34.4円			
変更	大鵬	ビラノア OD 錠 20mg	61.9円	大鵬	ビラノア錠 20mg	61.9円

情報の提供・お問い合わせは、埼玉協同病院薬剤科 DI室（048-296-8308）までどうぞ

担当 江藤・中村・木村