

















| 分類 | 商品名 | 色 | 写真 | 薬価・円/ 本(旧薬 価) | 室温での 安定性 | 組成 | | 血糖降下作用およびその目安 | | | 備考欄 |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|---|---------------------|-------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------|--|
| | | | | | | 超速効型 又は速効 型インスリン | 中間型 又は持効 型インスリン | 作用発現 時間 | 最大作用 発現時間 | 作用持 続時間 | |
| 新規 超速 効型 | 【限定】 ルムジェブ注ミリオペン | 紺 |  | 1324 (1374) | 4週間 | 100% | 0% | <5min | 0.5~1hr | 1~2hr | インスリンリ スプロ 投与時間に 注意 |
| | 【非採用】 フィアスプ注ソロスター | コーラル レッド |  | 1737 (1826) | 4週間 | 100% | 0% | <5min | 0.5~1hr | 1~2hr | インスリンア スパルト 投与時間に 注意 |
| 超速 効型 | インスリンリスプロBS注 ソロスターHU | シトラス イエロー |  | 1032 (1128) | 4週間 | 100% | 0% | <15min | 0.5~1.5hr | 3~5hr | インスリンリ スプロ |
| | 【院外限定】 ヒューマログ注ミリオペン | あずき |  | 1218 (1283) | 4週間 | 100% | 0% | <15min | 0.5~1.5hr | 3~5hr | |
| | インスリンアスパルトBS注 ソロスター | パール オレンジ |  | 1282 (1380) | 4週間 | 100% | 0% | 10~20min | 1~3hr | 3~5hr | インスリンア スパルト |
| | 【院外限定】 ノボラピッド注フレックスタッチ | オレンジ |  | 1570 (1693) | 4週間 | 100% | 0% | 10~20min | 1~3hr | 3~5hr | |
| | 【限定】 アピドラ注ソロスター | ブルー |  | 1648 (1792) | 4週間 | 100% | 0% | <15min | 0.5~1.5hr | 3~5hr | インスリン ゲルリジン |
| イン スリン アナ ログ 製剤 | ヒューマログミックス<25>注 ミリオペン | 黄 |  | 1280 (1339) | 4週間 | 25% | 75% | <15min | 0.5~6hr | 18~24hr | 混濁操作 必要 |
| | ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン | ロイヤルブ ルー |  | 1632 (1737) | 4週間 | 30% | 70% | 10~20min | 1~4hr | 約24hr | |
| | ヒューマログミックス【50】注 ミリオペン | 赤 |  | 1251 (1314) | 4週間 | 50% | 50% | <15min | 0.5~4hr | 18~24hr | |
| 配合 溶解 | ライソデグ配合注 フレックスタッチ | スカイブ ルー |  | 1879 (1999) | 4週間 | 30% | 70% | 10~20min | 1~3hr | >42hr (反復投 与時) | 混濁操作 不要 |
| 持 続 型 | インスリンラルギンBS注 ミリオペン | うぐいす |  | 1152 (1241) | 4週間 | インスリンラルギン 100% | | 1~2hr | 明らかなピー クなし | 約24hr | |
| | 【院外限定】 ランタス注ソロスター | 紫 |  | 1368 (1514) | 4週間 | インスリンラルギン 100% | | 1~2hr | 明らかなピー クなし | 約24hr | |
| | 【院外限定】 ランタスXR注ソロスター | アップルグ リーン |  | 2251 (2445) | 6週間 | インスリンラルギン 100% | | 1~2hr | 明らかなピー クなし | 約24hr超 | 空うち3単位 |
| | トリーバ注フレックスタッチ | 若草 |  | 2093 (2227) | 8週間 | インスリンデグルデ グ 100% | | 該当なし | 明らかなピー クなし | >42hr (反復投 与時) | 妊婦に使用 可能 (2023.5改 訂) 当院では妊 婦への使用 を積極的に 推奨しない。 |
| | 【限定】 レベミル注フレックスペン | グリーン |  | 2040 (2194) | 6週間 | インスリンデテミル 100% | | 1hr | | 3~14hr | 約24hr |

| 分類 | 商品名 | 色 | 写真 | 薬価・円/ 本 (旧 薬価) | 室温での 安定性 | 組成 | | 血糖降下作用およその目安 | | | 備考欄 |
|--|-------------------------------|------------|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------------|
| | | | | | | 超速効型 または速 効型インス リン | 中間型 または持 効型インス リン | 作用発現 時間 | 最大作用 発現時間 | 作用持 続時間 | |
| ヒトイン スリン製 剤 | 速効型 ノボリンR注【バイアル】 | 黄 |  | 275 (287) | 6週間 | 100% | 0% | 約30min | 1~3hr | 約8hr | |
| | 混合型 イノレット30R注 | 茶 |  | 1914 (2033) | 6週間 | 30% | 70% | 約30min | 2~8hr | 約24hr | |
| GLP-1受 容体 作動薬 | 【試用】 ビクトーザ皮下注18mg | |  | 9458 (9473) | 30日 | リラグルチド | | | | >24hr | 1日1回 朝又は夕 |
| | 【試用】 トルリシティ皮下注0.75mg | |  | 2807 (2917) | 14日 | デュラグルチド | | | | データな し(1回/ 週) | 1週間に1回 |
| | 【院外限定】 オゼンピック皮下注2mg | |  | 11008 | 8週間 | セマグルチド | | | | データな し(1回/ 週) | 1週間に1回 初回0.25mg から開始 |
| +持 続 イン ス リン 受 容 体 作 動 薬 | 【試用】 ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ | ルビン ピンク |  | 4847 (5121) | 3週間 (25°C以 下で4週 間) | トリー バ 1単位 | ビクト ー ザ 0.036mg | | | >24hr | 1日1回 |
| | 【院外限定】 ソリクア配合注ソロスター | マゼンタ |  | 5506 (5727) | 25°Cで 31日間 | インスリン グラルギ ン 1単位 | リキシセ ナチド 1μg | | | >24hr | 1日1回 |