中等症～重症患者の COVID-19患者への治療薬の特徴

	抗ウイルス薬	抗炎症薬		
商品名	ベクルリー®	デカドロン®	オルミエント®	アクテムラ®
成分名	レムデシビル	デキサメタゾン	バリシチニブ	トシリズマブ
投与経路	点滴静注	点滴静注/内服	内服	点滴静注
投与期間	5～10日間	10日間	14日間	1日間
治療対象患者	中等症Ⅰ（呼吸困難、肺炎があるが酸素需要のないもの）～	中等症Ⅱ（酸素需要が急激に増加している入院患者）～	中等症Ⅱ（酸素需要が急激に増加している入院患者）～	中等症Ⅱ（酸素需要が急激に増加している入院患者）～
発症後使用までの推奨日数	特になし	7日以内	入院後3日以内	7日以内
投与量	初日200mg, 以降100mgを1日1回	点滴静注）6.6mgを1日1回 内服）6mgを1日1回	4mgを1日1回	8mg/kgを1日1回 改善なければ8時間以上あけて1回可
対象年齢など	12歳以上、40kg以上	40kg未満は0.15mg/日へ減量を考慮	18歳以上	18歳以上
腎障害時の調整	不要	不要		不要
妊婦/授乳婦への投与	可	プレドニゾロン40mg/日への変更を考慮	禁忌（投与後、1月経周期避妊）	可
omicron株への有効性	○	–	–	–
入院or死亡の相対リスク減少率	45%（停流量酸素のみでは71%）	12%	38.20%	11.40%
注意を要する副作用	infusion reaction 肝腎障害、徐脈	電解質異常、白血球増多	悪心、腹痛、LDL-Cho上昇、帯状疱疹	上気道炎、肝障害、白血球減少
同意書の有無	不要			
薬価（1日分として）	61,997円/1瓶	（一般流通なし）		
注意点	挿管や高流量の酸素投与に至った重症例では効果が期待できない可能性が高い	酸素投与を要さない患者への投与は推奨しない	ベクルリーとの併用必要 結核（抗酸菌）のスクリーニングを考慮	ステロイド薬との併用が必要 8時間以上の間隔をあけて1回の追加投与が可能 結核（抗酸菌）のスクリーニングを考慮

参考資料；
「COVID-19に対する薬物治療の考え方　第15.1版」（2023年2月14日）
「COVID-19　診療の手引き　第9.0版」（2023年2月10日）
各薬剤の添付文書、同意説明文書