

●腎機能別 DOAC 投与量一覧

先発商品名	リクシアナ	エリキュース	イグザレルト	プラザキサ
一般名	エドキサバン	アピキサバン	(限定採用) リバーロキサバン	(限定採用) ダビガトラン
腎排泄率	48%	27%	36%	85%
心房細動	1 日 1 回 60kg 超: 60mg 60kg 以下: 30mg ★禁忌★ Ccr<15 30mg へ減量・減量考慮 ・15 ≤ Ccr < 50 ・P 糖蛋白阻害剤 ベラパミル アミオダロン等 15mg へ減量考慮 80 歳以上 かつ 出血性素因が 1 つ以上等 ↓ ・重要器官での出血既往 ・45kg 以下 ・15 ≤ Ccr < 30 ・NSAIDs 常用 ・抗血小板薬の使用	1 回 5mg 1 日 2 回 ★禁忌★ Ccr<15 2.5mg へ減量 下記 2 つ以上該当 ・80 歳以上 ・60kg 以下 ・血清 Cre ≥ 1.5 2.5mg へ減量考慮 イトラコナゾール ボリコナゾール リトナビル 等	1 回 15mg 1 日 1 回 ★禁忌★ ・Ccr<15 ・イトラコナゾール ボリコナゾール ミコナゾール パキロビット ゾコーバ等 10mg へ減量 ・Ccr 15-49 10mg へ減量考慮 フルコナゾール クラリスロマイシン エリスロマイシン	1 回 150mg 1 日 2 回 ★禁忌★ ・Ccr<30 ・イトラコナゾール 110mg へ減量考慮 ・Ccr30-50 ・P-糖蛋白阻害剤 ベラパミル アミオダロン等 ・70 歳以上 ・消化管出血既往
静脈血栓 塞栓症	1 日 1 回 60kg 超: 60mg 60kg 以下: 30mg ★禁忌★ Ccr<15 30mg へ減量・減量考慮 ・15 ≤ Ccr < 50 ・P 糖蛋白阻害剤 ベラパミル アミオダロン等	初めの 7 日間 1 回 10mg 1 日 2 回 その後 1 回 5mg 1 日 2 回 ★禁忌★ Ccr<30 半量への減量考慮 イトラコナゾール ボリコナゾール リトナビル等	初めの 3 週間 1 回 15mg 1 日 2 回 その後 1 回 15mg 1 日 1 回 ★禁忌★ ・Ccr<30 ・イトラコナゾール ボリコナゾール ミコナゾール パキロビット ゾコーバ等 10mg へ減量考慮 フルコナゾール クラリスロマイシン エリスロマイシン	